ВРАЩЕНИЕ ГАЛО МЛЕЧНОГО ПУТИ В ОКОЛОСОЛНЕЧНОЙ ОКРЕСТНОСТИ ПО ДАННЫМ GAIA DR3

© 2024 г. Р. В. Ткаченко^{1,*}, А. П. Брындина¹, А. Б. Жмайлова¹, В. И. Корчагин¹

¹Институт Физики, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

*E-mail: rtkachenko@sfnedu.ru

Поступила в редакцию 16.03.2024 г.

После доработки 21.05.2024 г.

Принята в печать 04.06.2024 г.

Исследуется вращение гало Млечного Пути в околосолнечной окрестности по кинематическим данным из каталога GAIA DR3 для переменных звезд типа RR Лиры, для которых ошибка в параллаксах менее 20%. Для выборки звезд гало использовались два критерия: кинематический и пространственный. В обоих подходах мы подтверждаем наличие слабого вращения гало в направлении, противоположном вращению Галактического диска со скоростями 4.08 ± 2.19 км/с для кинематического критерия отбора и 9.49 ± 2.59 км/с для пространственного критерия.

Ключевые слова: RR Лиры, Млечный Путь, гало, кинематика звёзд

DOI: 10.31857/S0004629924070055 EDN: IUMOLX

1. ВВЕДЕНИЕ

Изучение формирования и эволюции галактик до сих пор остается одним из важнейших направлений современной астрофизики. Гало, как одна из старейших подсистем Млечного Пути, является базой для прослеживания истории формирования Галактики. Эгген и др. [1] высказали предположение, согласно которому старые звезды гало образовались в результате быстрого гравитационного коллапса протогалактического облака. Вскоре авторы [2], исследуя химический состав 177 красных гигантов в 19 шаровых скоплениях гало, обнаружили, что металличность скоплений не зависит от их галактоцентрического расстояния, и выдвинули предположение, что гало Галактики образовалось в результате аккреции карликовых галактик. В настоящее время является общепризнанным, что гало Галактики или, по крайней мере, его большая часть образовалось в результате иерархического слияния небольших звездных систем, таких как шаровые скопления и карликовые галактики, подобно аккрецирующей и разрушающейся в настоящее время галактики Стрелец [3]. Обширные наблюдательные данные, собранные к настоящему времени, демонстрируют, что гало имеет сложную структуру, включающую звездные потоки и карликовые галактики, разрушающиеся в результате приливного взаимодействия [3]. Наблюдательные данные, таким образом, полностью подтверждают иерархическую модель образования гало Млечного Пути, когда в процессе длительной эволюции разру-

шившихся в прошлом карликовых галактик сформировалось галактическое гало, история образования которого может быть отслежена по наблюдаемым в гало пространственным структурам [4].

Суммарный угловой момент гало Галактики связан с историей аккреции объектов, включающих не только карликовые галактики, такие как Стрелец, но и с аккрецией более крупных объектов, таких, как недавно открытая аккрецированная галактика Гайя-Энцеладус [5], с аккрецией которой связана значительная доля ретроградно вращающихся звезд. Если аккреция отдельных галактик происходит в случайных направлениях, суммарный вращательный момент звезд гало L_z должен быть близок к нулю [6]. Отметим также, что проградное вращение части звезд гало может быть обусловлено их взаимодействием с вращающимся баром [7].

До настоящего времени отсутствует консенсус о наличии или отсутствии вращения гало Галактики. Уткин и др. [8] по данным GAIA DR2 нашли слабое проградное вращение внутреннего гало, и его ретроградное вращение во внешних областях. Тиан и др. [9] по кинематическим данным К-гигантов сообщили о наличии слабого проградного вращения местного гало. В работе [10] по данным GAIA DR2 было найдено слабое ретроградное вращение гало Млечного Пути. Каролло и др. [11], используя выборку звезд типа RR Лиры, обнаружили, что гало Млечного Пути в его внутренних областях имеет заметное проградное вращение, что контрастирует с вращением гало во

Рис. 1. Распределение звёзд в галактической системе координат (l, b) , где долгота $l = 0$ и широта $b = 0$ соответствуют положению галактического центра. Шкала справа показывает гелиоцентрические расстояния объектов d .

ретроградного движения звезд. Из диаграмм $(V_\phi, \Delta N)$, (V_ϕ, V_z) , (L_z, E) видно, что представленная выборка звезд позволяет выделить несколько структурных компонент галактики. Так, на диаграмме $(V_\phi, \Delta N)$ пик скорости в области $V_\phi = -230$ км/с связан с лиридами, принадлежащими дисковой компоненте. Эта структура также прослеживается на диаграмме (V_ϕ, V_z) в области $V_\phi = -230$ км/с и $V_z = 0$ км/с и наблюдается в виде ответвления в нижней левой части диаграммы (L_z, E) .

В следующем разделе мы обсудим критерии отбора звезд гало и оценку скорости вращения гало в околосолнечной окрестности для различных критериев отбора.

3. КИНЕМАТИКА ГАЛО В ОКОЛОСОЛНЕЧНОЙ ОКРЕСТНОСТИ

Для получения выборки звезд, принадлежащих гало Млечного Пути, мы используем два подхода: кинематический (далее A1) и пространственный (далее A2). В обоих указанных выше подходах мы используем следующие общие критерии: выбираются звезды, находящиеся в цилиндрическом слое, ограниченном галактоцентрическими радиусами 4 и 12 кпк, гелиоцентрическое расстояние d которых не превышает 10 кпк. Следуя [12] мы исключаем из рассмотрения лириды, обладающие большими скоростями $\sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2} > 400$ км/с, а также звезды с моментами импульсов, превышающими $|L_z| > 2000$ кпк·км/с.

Отбор звезд гало в кинематическом критерии A1 базируется на данных о значениях компонент дисперсии скоростей для толстого диска Галактики в околосолнечной окрестности. Согласно [23] радиальная дисперсия скоростей звезд толстого диска в околосолнечной окрестности равна $\sigma_{V_R} = 49$ км/с. Дисперсия скоростей звезд толстого диска Галактики растет с уменьшением галактоцентрического радиуса. Значение радиальной дисперсии скоростей толстого диска Галактики на радиусе 4 кпк можно оценить, считая, что дисперсия скоростей толстого диска изменяется по экспоненциальному закону с масштабом $h_{\sigma_R} = 7.4$ кпк [24, 25]. С учетом принятой шкалы, радиальная дисперсия звезд в области 4 кпк оказывается равной $\sigma_{V_R} = 87$ км/с. Для оценки дисперсии в направлении, перпендикулярном диску, мы используем значение отношения дисперсий $\sigma_{V_z} / \sigma_{V_R}$, которое по оценкам разных авторов варьируется в пределах 0.45–0.6 [25]. Выбирая более жесткую оценку для этого отношения, равную 0.6, мы получаем, что дисперсия скоростей толстого диска в перпендикулярном направлении на расстоянии $R = 4$ кпк от центра Галактики равна $\sigma_{V_z} = 52$ км/с. Чтобы избежать подмешивания звезд толстого диска к выборке звезд гало, мы использовали критерий $V_{R,z} > 3\sigma_{V_R, V_z}$, принимая $\langle V_R \rangle$ и $\langle V_z \rangle$ равными 0 км/с. Таким образом, кинематический критерий для получения выборки звезд гало имеет вид: $|V_R| > 261$ км/с и $|V_z| > 156$ км/с.

Рис. 2. Верхний ряд: распределение звезд RR Лиры в пространствах (x, y) и (x, z) . Средний ряд: гистограммы распределения $(d, \Delta N)$ и $(V_\phi, \Delta N)$. Внизу: распределения звезд в пространствах (V_ϕ, V_z) и (L_z, E) . Вертикальными пунктирными линиями разделены объекты, имеющие проградное и ретроградное вращение.

Независимо был использован пространственный критерий A2 отождествления звезд гало, согласно которому звезда считается принадлежащей гало, если ее координата $|z| > 3.6$ кпк, что более чем в четыре раза превышает вертикальный масштаб толстого диска Галактики в околосолнечной окрестности [26, 23].

На рис. 3 представлены распределения звезд Гало в пространствах $(V_\phi, \Delta N)$ и (L_z, E) , отобранных по критериям A1 и A2. Выборка звезд гало, отобранная по кинематическому критерию A1, имеет слабое ретроградное вращение со средней вращательной скоростью $\langle V_\phi \rangle = 7.37$ км/с при среднем моменте импульса $\langle L_z \rangle = 55.64$ кпк·км/с. Из 715 звезд, отобранных по этому критерию, в направлении вращения диска движутся $N_{\text{pro}} = 326$ звезд,

в то время как $N_{\text{ret}} = 389$ звезд имеют ретроградное вращение.

Средняя вращательная скорость, определяемая по пространственному критерию A2, оказывается равной $\langle V_\phi \rangle = 8.94$ км/с при среднем моменте импульса $\langle L_z \rangle = 97.26$ кпк·км/с. Полное число звезд, отобранных по этому критерию, равно 544, из которых проградное вращение имеют $N_{\text{pro}} = 229$ звезд, и ретроградное $N_{\text{ret}} = 315$. Отметим, что для обоих критериев отбора количество звезд, имеющих ретроградное вращение, превышает число звезд, движущихся в направлении вращения диска.

На рис. 4 показаны распределения звезд гало по перицентрам r_{peri} , апоцентрам r_{apo} , и эксцентриситетам e , отобранных по обоим критериям. Значения

Рис. 3. Гистограмма распределения вращательной скорости звезд гало и распределение звезд гало в пространстве (L_z, E) , отобранных по кинематическому (верхний ряд) и пространственному (нижний ряд) критериям.

Рис. 4. Кинематические характеристики звезд, отобранных по кинематическому (левый столбец) и пространственному (правый столбец) критериям. Показаны распределения перицентров r_{peri} (верхний ряд), апоцентров r_{apo} (средний ряд) и эксцентриситетов e звезд (нижний ряд).

перицентров, апоцентров и эксцентриситетов звезд получены путем численного интегрирования их орбит в течение 3 млрд. лет вперед во времени в потенциале McMillan17 [21] с помощью пакета galpy [20]. Максимальный период орбит звезд выборки составляет ≈ 600 млн. лет. Таким образом, принятого времени интегрирования достаточно для точного определения параметров орбит. Из рис. 4 видно, что подавляющее число звезд имеет сравнительно малые перицентры (< 4 кпк) и вытянутые орбиты с эксцентриситетами ($e > 0.7$). Отметим, что значительная часть звезд выборки подходит к галактическому бару достаточно близко. Однако взаимодействие лирид гало с проградно вращающимся баром не оказывает существенного влияния на их динамику, и наблюдаемое вращение гало оказывается слабо ретроградным.

Для учета ошибок в значениях параллакса, собственных движений и лучевых скоростей звезд, а также для учета ошибки в определении скорости Солнца относительно галактического центра и его влияния на значение средней скорости и момента импульса вращающегося гало мы провели статистический эксперимент, в котором тысячу раз генерировались искусственные выборки звезд в пределах ошибок наблюдательных данных. В каждом эксперименте генерировались значения параметров для искусственной выборки из 4353 звезд, в каждой из которых применялись критерии отбора звезд гало, и вычислялись средние значения вращательной скорости гало и его полного момента импульса. В результате, для кинематического критерия A1 среднее вращение гало по 1000 статистическим экспериментам оказалось равным $\langle V_\phi \rangle = 4.08$ км/с со стандартным отклонением от среднего значения $\sigma_{\langle V_\phi \rangle} = 2.19$ км/с. Средний момент импульса оказывается равным в этом случае $\langle L_z \rangle = 34.53$ кпк·км/с при стандартном отклонении $\sigma_{\langle L_z \rangle} = 14.07$ кпк·км/с. Среднее число звезд гало, отобранных по критерию A1, оказывается равным $\langle N \rangle = 692.53$ со стандартным отклонением $\sigma_{\langle N \rangle} = 12.00$. Среднее число звезд, вращающихся в направлении вращения диска, оказывается равным $\langle N_{\text{pro}} \rangle = 327.37$ с $\sigma_{\langle N_{\text{pro}} \rangle} = 10.46$, а для ретроградных — $\langle N_{\text{ret}} \rangle = 365.15$ с $\sigma_{\langle N_{\text{ret}} \rangle} = 10.73$.

Для пространственного критерия A2 средняя скорость вращения гало по результатам статистического эксперимента оказывается равной $\langle V_\phi \rangle = 9.50$ км/с, со стандартным отклонением от среднего значения $\sigma_{\langle V_\phi \rangle} = 2.59$ км/с при среднем моменте импульса $\langle L_z \rangle = 96.94$ кпк·км/с со стандартным отклонением $\sigma_{\langle L_z \rangle} = 19.00$ кпк·км/с. При

этом среднее число отобранных звезд в гало оказывается равным $\langle N \rangle = 510.57$, со стандартным отклонением $\sigma_{\langle N \rangle} = 9.73$. Среднее число звезд, вращающихся проградно, составляет $\langle N_{\text{pro}} \rangle = 218.47$ с $\sigma_{\langle N_{\text{pro}} \rangle} = 8.13$, а для ретроградных — $\langle N_{\text{ret}} \rangle = 292.10$ с $\sigma_{\langle N_{\text{ret}} \rangle} = 8.66$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью данных из каталога GAIA DR3 для переменных звезд типа RR Лиры было оценено вращение гало Млечного Пути в околосолнечной окрестности. Для получения выборки звезд гало мы использовали два критерия: кинематический, когда выбираются звезды, компоненты скоростей которых в направлении, перпендикулярном диску, в три раза превышают значение дисперсии скоростей толстого диска в этом направлении на расстоянии $R = 4$ кпк от центра Галактики, и пространственный, при котором отбирались звезды, находящиеся над плоскостью диска на расстояниях, превышающих четыре вертикальных масштаба распределения плотности звезд толстого диска Галактики.

В обоих случаях отмечается слабое вращение гало в направлении, противоположном вращению диска, со скоростями и стандартными отклонениями для критерия A1 $\langle V_\phi \rangle = 4.08 \pm 2.19$ км/с, и моментом импульса $\langle L_z \rangle = 34.53 \pm 14.07$ кпк·км/с. Для пространственного критерия отбора эти значения равны $\langle V_\phi \rangle = 9.50 \pm 2.59$ км/с, при значении момента импульса $\langle L_z \rangle = 96.94 \pm 19.00$ кпк·км/с. В обоих случаях наблюдается превышение в 15–30% числа звезд, имеющих вращение в направлении, противоположном вращению диска Галактики. Лиу и др. [12], используя положение Солнца $R_{\text{Sun}} = 8.34$ кпк и его компоненты скорости (7.0, 252, 4.95) км/с, не находят заметного вращения лирид с высокой металличностью, подтверждая, однако, проградное вращение лирид с низкой металличностью со скоростью ~ 16.5 км/с. Тиан и др. [9], базируясь на выборке К-гигантов в окрестности 4 кпк от Солнца, обнаружили проградное вращение гало со скоростью 27 км/с, предполагая, что скорость локального стандарта покоя $V_{\text{LSR}} = 232$ км/с и скорость Солнца относительно LSR (11.1, 12.24, 7.25) км/с. Уткин и др. [8], используя $V_{\text{LSR}} = 237 \pm 7$ км/с и пекулярную скорость в направлении вращения $V_{\text{pec, Sun}} = 13.4 \pm 0.4$ км/с, нашли проградное вращение гало со скоростью 20–30 км/с внутри солнечного круга, проградное вращение гало со скоростью 10–20 км/с в его окрестности, отсутствие вращения гало в области

10–15 кпк и его ретроградное вращение за пределами 15 кпк. В работе [10], приняв положение Солнца $R_{Sun} = 8.13 \pm 0.03$ кпк и его скорость $(-11.10 \pm 1.23, 250.24 \pm 9.23, 7.25 \pm 0.63)$ км/с было найдено ретроградное вращение гало со скоростью $\sim 10 - 20$ км/с.

Таир и др. [27] оценили вращение гало близлежащих галактик по наблюдениям облаков холодного газа с температурой около 2.7 К, находящихся в тепловом равновесии с реликтовым излучением. Хотя их наблюдения [27] не позволяют оценить вращение гало галактик во внутренних областях на расстояниях менее 10 кпк от центра, вращательные скорости, полученные ими во внутренних областях гало, близки к значениям, полученным в настоящей работе. Так, для галактики М31 вращение гало, оцененное по холодным газовым облакам, оказалось в диапазоне от ~ -0.5 до 1 км/с на расстоянии ~ 21 кпк от центра. Вращательная скорость гало галактики NGC 5494 на расстоянии 15 кпк равна $\sim -(13 - 17)$ км/с, а вращательная скорость гало М81 на расстоянии 15 кпк оценена в 13–48 км/с.

Базируясь на выборке звезд типа RR Лиры, для которых известны собственные движения с ошибками в расстояниях не превышающих 20%, мы показываем, что с учетом всех ошибок наблюдений и ошибки в определении скорости LSR, скорость ретроградного вращения гало Млечного Пути в околосолнечной окрестности не превышает 4.0–9.5 км/с, что меньше большинства предыдущих оценок.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование было выполнено в Южном федеральном университете при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Государственный контракт GZ0110/23-10-IF).

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают искреннюю благодарность анонимному рецензенту за полезные замечания и внимание, уделенное работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O. J. Eggen, D. Lynden-Bell, and A. R. Sandage, 136, 748 (1962).
2. L. Searle and R. Zinn, 225, 357 (1978).
3. V. Belokurov, D. B. Zucker, N. W. Evans, G. Gilmore, et al., 642(2), L137 (2006), arXiv:astro-ph/0605025.

4. A. Helmi, S. D. M. White, P. T. de Zeeuw, and H. Zhao, Nature 402(6757), 53 (1999), arXiv:astro-ph/9911041.
5. A. Helmi, C. Babusiaux, H. H. Koppelman, D. Massari, J. Veljanoski, and A. G. A. Brown, Nature 563(7729), 85 (2018), arXiv:1806.06038 [astro-ph.GA].
6. R. E. Sanderson, A. Helmi, and D. W. Hogg, 801(2), id. 98 (2015), arXiv:1404.6534 [astro-ph.GA].
7. E. Athanassoula, R. E. G. Machado, and S. A. Rodionov, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 429(3), 1949 (2013), arXiv:1211.6754 [astro-ph.CO].
8. N. D. Utkin, A. K. Dambis, A. S. Rastorguev, A. D. Klinchev, I. Ablimit, and G. Zhao, Astron. Letters 44(11), 688 (2018).
9. H. Tian, C. Liu, Y. Xu, and X. Xue, 871(2), id. 184 (2019), arXiv:1805.08326 [astro-ph.GA].
10. G. Iorio and V. Belokurov, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 502(4), 5686 (2021), arXiv:2008.02280 [astro-ph.GA].
11. D. Carollo, T. C. Beers, Y. S. Lee, M. Chiba, et al., Nature 450(7172), 1020 (2007), arXiv:0706.3005 [astro-ph].
12. G. Liu, Y. Huang, S. A. Bird, H. Zhang, F. Wang, and H. Tian, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 517(2), 2787 (2022), arXiv:2209.07885 [astro-ph.GA].
13. V. Ripepi, G. Clementini, R. Molinaro, S. Leccia, et al., Astron. and Astrophys. 674, id. A17 (2023), arXiv:2206.06212 [astro-ph.SR].
14. M. Taylor, arXiv:1707.02160 [astro-ph.IM] (2017).
15. L. Lindegren, J. Hernández, A. Bombrun, S. Klioner, et al., Astron. and Astrophys. 616, id. A2 (2018), arXiv:1804.09366 [astro-ph.IM].
16. T. P. Robitaille, E. J. Tollerud, P. Greenfield, M. Droettboom, et al., Astron. and Astrophys. 558, id. A33 (2013), arXiv:1307.6212 [astro-ph.IM].
17. R. Abuter, A. Amorim, N. Anugu, M. Bauböck, et al., Astron. and Astrophys. 615, id. L15 (2018), arXiv:1807.09409 [astro-ph.GA].
18. R. Drimmel and E. Poggio, Res. Notes Amer. Astron. Soc. 2(4), id. 210 (2018).
19. M. Bennett and J. Bovy, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 482(1), 1417 (2019), arXiv:1809.03507 [astro-ph.GA].
20. J. Bovy, Astrophys. J. Suppl. 216(2), id. 29 (2015), arXiv:1412.3451 [astro-ph.GA].
21. P. J. McMillan, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 465(1), 76 (2017), arXiv:1608.00971 [astro-ph.GA].
22. R. Tkachenko, V. Korchagin, A. Jmailova, G. Carraro, and B. Jmailov, Galaxies 11(1), id. 26 (2023), arXiv:2303.05603 [astro-ph.GA].

23. *K. Vieira, G. Carraro, V. Korchagin, A. Lutsenko, T. M. Girard, and W. van Altena*, 932(1), id. 28 (2022), arXiv:2205.00590 [astro-ph.GA].
24. *V. Korchagin, A. Lutsenko, R. Tkachenko, G. Carraro, and K. Vieira*, Galaxies 11(5), id. 97 (2023), arXiv:2310.10327 [astro-ph.GA].
25. *S. Khrapov, A. Khoperskov, and V. Korchagin*, Galaxies 9(2), id. 29 (2021), arXiv:2105.03198 [astro-ph.GA].
26. *M. Jurić, Ž. Ivezić, A. Brooks, R. H. Lupton, et al.*, 673(2), 864 (2008), arXiv:astro-ph/0510520.
27. *N. Tahir, F. De Paolis, A. Qadir, and A. A. Nucita*, Symmetry 15(1), id. 160 (2023), arXiv:2301.03249 [astro-ph.GA].

ROTATION OF THE MILKY WAY HALO IN THE SOLAR NEIGHBORHOOD BASED ON GAIA DR3 CATALOG

R. V. Tkachenko¹, A. P. Bryndina¹, A. B. Zhmailova¹, V. I. Korchagin¹

¹*Institute of Physics, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia*

The rotation of the Milky Way halo in the solar neighborhood is investigated using kinematic data from the GAIA DR3 catalog for RR Lyrae variable stars with parallax errors of less than 20%. Two criteria were used for selecting halo stars — kinematic and spatial. In both approaches, we confirm the existence of weak rotation of the halo in the direction opposite to the rotation of the Galactic disk with velocities of 4.08 ± 2.19 km/s for the kinematic criterion and 9.49 ± 2.59 km/s for the spatial criterion.

Keywords: RR Lyraes, Milky Way, halo, kinematics of stars