Биостратиграфия позднеголоценовых донных осадков из северной части Чукотского моря

Краткое сообщение

LIMNOLOGY
FRESHWATER
BIOLOGY

Вологина Е.Г.^{1,*}, Кулагина Н.В.¹, Черняева Г.П.¹, Штурм М.², Колесник А.Н.³

¹ Институт земной коры СО РАН, ул. Лермонтова, 128, Иркутск, 664033, Россия

² Швейцарский федеральный институт науки и технологии окружающей среды, Überlandstrasse, 133, Dübendorf, 8600, Швейцария

³ Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, ул. Балтийская, 43, Владивосток, 690041, Россия

АННОТАЦИЯ. Целью исследования является изучение процессов современного осадконакопления в акватории Северного Ледовитого океана. Колонка донных осадков (длина – 37 см) была отобрана в северной части Чукотского моря. Аналитические методы включали макроскопическое описание с анализом препаратов-мазков (smear-slides), датирование по ¹³⁷Cs и ²¹⁰Pb, диатомовый и палинологический анализы. Скорость седиментации в точке исследования составила 1 мм/год. Таким образом, изученные отложения накапливались в течение ~ 400 лет, включая Малый ледниковый период. Повышенное содержание холодноводных видов диатомей и спор наземных растений в нижнем слое исследованных осадков характеризуют холодные климатические условия, господствовавшие во время Малого ледникового периода. Наличие юрских, меловых и неогеновых видов спор и пыльцы в голоценовых отложениях свидетельствует о береговой абразии и последующей транспортировке материала течениями к месту отбора керна. Южные, субтропические и тропические виды диатомей в верхней части колонки связаны с их переносом течениями из Тихого океана в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Результаты биостратиграфических анализов свидетельствуют об изменениях окружающей среды за последние 400 лет, проявленных в донных отложениях из северной части Чукотского моря.

Ключевые слова: Чукотское море, донные отложения, Малый ледниковый период, современное осадконакопление, пыльца, диатомовые водоросли.

Для цитирования: Вологина Е.Г., Кулагина Н.В., Черняева Г.П., Штурм М., Колесник А.Н. Биостратиграфия позднеголоценовых донных осадков из северной части Чукотского моря // Limnology and Freshwater Biology. 2024. - № 2. - С. 48-57. DOI: 10.31951/2658-3518-2024-A-2-48

1. Введение

Современное потепление климата (Brohan et al., 2006; Wilson et al., 2007) приводит к изменениям природной среды, как на континентах, так и в океанах. Объектом наших исследований является Чукотское море, расположенное между Чукоткой и Аляской и являющееся окраинным морем Северного Ледовитого океана. За последние десятилетия среднегодовая температура воздуха здесь повысилась, что в значительной мере определило сокращение площади ледяного покрова (Stone, 1997; Crane, 2005). Такие изменения находят своё отражение и в вещественном составе донных осадков Чукотского моря (Астахов и др., 2018; Вологина и др., 2018; Astakhov et al., 2019; Vologina et al., 2019).

Отличительной особенностью Чукотского моря по сравнению с другими краевыми морями

Северного Ледовитого океана является достаточно высокая биологическая продуктивность, обусловленная проникновением более теплых тихоокеанских вод через Берингов пролив (Огородников и Русанов, 1978; Grebmeier et al., 2006; Astakhov et al., 2015). Поэтому биостратиграфические методы изучения донных отложений здесь исключительно важны и находят своё широкое применение (Саидова, 1994; de Vernal et al., 2005; Obrezkova et al., 2023).

В статье приводятся данные палинологического и диатомового анализов верхних слоёв донных отложений, отобранных в северной части Чукотского моря, позволяющие лучше понять процессы современного осадконакопления в этом регионе Северного Ледовитого океана.

*Автор для переписки.

Адрес e-mail: vologina@crust.irk.ru (E.G. Vologina)

Поступила: 08 апреля 2024; Принята: 22 апреля 2024;

Опубликована online: 27 апреля 2024

© Автор(ы) 2024. Эта работа распространяется под международной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

2. Материалы и методы

Осадки были получены во время международной экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Хромов» в 2012 г. Керн b16 (длина – 37 см) отобран пробоотборником типа «boxcorer» в северной части Чукотского моря на глубине 100 м в точке с координатами 72°32'37.8" N 175°59'42" W (Рис.1). Проведено макроскопическое описание разреза, сопровождаемое просмотром препаратов-мазков (smear-slides) на световом микроскопе марки SK14 (увеличение $\times 100$). Описание препаратов-мазков включало качественную оценку гранулометрического состава осадков, определялось наличие терригенных и биогенных компонентов. Проведено датирование осадков по ^{210}Pb и ^{137}Cs (Вологина и др., 2018; Vologina et al., 2019). Диатомовый и палинологический анализы выполнены с шагом опробования от 1 см до 2 см. Диатомовый анализ проводился по методике, описанной в (Жузе и др., 1969; Диатомовые..., 1974) и результаты были частично опубликованы (Вологина и др., 2018). Техническая обработка проб для палинологического анализа выполнялась по известной методике (Berglund and Ralska-Jasiewiczowa, 1986).

3. Результаты

Отложения, вскрытые керном b16, представлены пелито-алевритами с незначительной примесью песка (Рис.2). Относительно однородный литологический состав свидетельствует о стабильной обстановке седиментации во время их образования. Результаты датирования показывают, что скорость современного осадконакопления в точке отбора колонки b16 составляет около 1 мм/год. Таким образом, осадки являются позднеголоценовыми, их возраст равен примерно 400 лет и соответствует отрезку от Малого ледникового периода (МЛП) с 1600–1850 гг. н.э. до настоящего времени. (Вологина и др., 2018).

3.1. Результаты палинологического анализа

Общее содержание спор и пыльцы в отложениях, вскрытых керном b16, колеблется от 221 до 637 экземпляров (Рис.2). По особенностям состава спектров можно выделить две секции.

Секция 1: 17–37 см. Доминантами являются *Picea obovata* и *Sphagnum* sp. Для интервала характерно большое содержание спор (46–54 %), особенно *Sphagnum* sp. (30–38 %). Пыльца деревьев составляет 19–28 % и представлена главным образом *Picea obovata* (13–21 %), *Pinus* sec. *Cembra* (2–4 %) и *P. sylvestris* (2–4 %). Кустарники (12–21 %) встречаются реже и состоят в основном из *Betula* type *Nanae* (6–13 %) и *Duschekia* sp. (4–10 %). Пыльца трав (7–15 %) представлена главным образом *Ericales* (1–7 %), *Artemisia* sp. (до 3 %), *Cyperaceae* (до 2 %) и разнотравьем (2–5 %).

Рис.1. Схема Чукотского моря с точкой отбора колонки b16. Стрелками отмечены основные течения по (Stein et al., 2017): СПТ – сибирское прибрежное течение; ТКГ – течение каньона Геральд; ТЦК – течение центрального канала; ТКБ – течение каньона Барроу; АПТ – Аляскинское прибрежное течение.

Секция 2: 0–17 см. В этой части разреза доминируют *Picea obovata*, *Betula* type *Nanae*, *Duschekia* sp. и *Sphagnum* sp. Содержание спор (43–51 %) снижается и представлено *Sphagnum* sp. (29–37 %), *Polypodiaceae* (4–9 %), *Lycopodiaceae* (2–5 %). Количество пыльцы деревьев меняется незначительно (12–28 %). Характерны *Picea obovata* (8–20 %), *Pinus* sec. *Cembra* (1–4 %), *Pinus sylvestris* (1–4 %), *Betula* type *Albae* (до 2 %). В спектрах отмечается больше пыльцы кустарников (16–29 %), а именно *Betula* type *Nanae* (8–14 %), *Duschekia* sp. и *Salix* sp. (6–16 %). На пыльцу трав приходится 9–12 %, в том числе *Ericales* (1–5 %), *Cyperaceae* (до 4 %), *Artemisia* sp. (до 4 %), *Poaceae* (до 2 %) и различных трав (2–4 %).

По всей колонке встречается до 1.8 % переложенных форм неогенового возраста (*Tsuga* sp., *Juglandaceae*, *Carya* sp., *Myrica* sp., *Alnus* sp., *Quercus* sp., *Betula* sp., *Corylus* sp., *Ulmus* sp., *Tilia* sp., *Osmunda* sp.) и до 1 % форм юрского и мелового периодов (*Cyathidites*-type, *Pinus protoembra*, *Gleicheniidites* sp., *Ginkgo* sp., *Cicatricosisporites* sp.) (Рис.2).

3.2. Результаты диатомового анализа

Распределение наиболее типичных диатомей в отложениях колонки b16 представлено в Таблице. Всего выявлено 54 таксона диатомей. В видовом составе преобладают планктонные формы (61.1 %). Содержание неритических видов составляет 30 %, океанических – 26 % и сублиторальных – 18.5 %.

Арктобореальные и суббореальные виды достигают 62.8 % от общего содержания диатомей. Отмечается присутствие южнобореальных, субтропических и тропических видов, а также переложенных древних диатомей.

Рис.2. Керн b16: фотография, литология и спорово-пыльцевая диаграмма. Условные обозначения к литологической колонке: 1 – пелит, 2 – алевроит, 3 – песок, 4 – диатомеи. Примечание к спорово-пыльцевой диаграмме: N – неоген, J-K – юра-мел.

Около половины всех створок приходится на споры рода *Chaetoceros* Ehr. (до 60 %) и виды *Chaetoceros* sp. (до 28 %). Доля *Coscinodiscus marginatus* Ehr. составляет 0.5–8.3 %, *Ch. mitra* (Bailey) Cleve – 1.1–8.4 %. Повышенное содержание створок большинства видов отмечается в нижней части колонки (Секция 1, Таблица), где доминируют арктобореальные, холодолюбивые виды рода *Thalassiosira*: *Th. antarctica*, *Th. hyalina*, а также *Bacterosira fragilis*, *Coscinodiscus marginatus*, *Actinocyclus* sp, *Paralia sulcata* (Ehr.) Cl., *Rhizosolenia hebetata* (Bail.) Gran. и многочисленные представители рода *Chaetoceros*.

4. Обсуждение

Голоценовые осадки Чукотского моря состоят преимущественно из материала, образованного за счёт размыва дна и абразии берегов (Яшин, 2000). На речной сток приходится не более 7 %. В отложениях северной части Чукотского моря терригенные фракции преобладают над биогенными компонентами.

В палинологических спектрах осадков колонки b16 в целом отражена лесотундровая и тундровая растительность, распространённая на побережье Чукотского моря. Отмечается преобладание пыльцы кустарников, трав и спор. В нижней части разреза, соответствующей по времени МЛП, наблюдается повышение содержания спор, что,

вероятно, связано с более холодными климатическими условиями. По всему разрезу встречаются переотложенные виды юры, мела и неогена (Рис.2), указывающие на береговую абразию и последующий перенос течениями. Результаты анализа искажены существенным содержанием пыльцы хвойных пород (особенно ели), наиболее вероятным способом привноса которых являются течения из Берингова моря.

Подавляющее большинство диатомей, наблюдаемых в донных осадках колонки b16 (почти 2/3 всего видового состава), характерно для холодных вод высоких широт. Присутствие южнобореальных, субтропических и тропических видов связано, по всей вероятности, с их транспортировкой через Берингов пролив (Astakhov et al., 2015; Вологина и др., 2018), чему способствуют основные течения (Grebmeier et al., 2006). Изменения видового состава и количественного содержания створок в осадках, позволяют выделить два этапа осадконакопления. Во время формирования отложений нижней половины разреза были, без сомнения, более низкие температуры. Это вызвало снижение биологической продуктивности и привело к увеличению численности холодолюбивых видов рода *Thalassiosira* (Таблица) (Вологина и др., 2018).

Полученные материалы хорошо соотносятся с вариациями химического состава донных отложений, отобранных в северной части Чукотского

Таблица. Содержание наиболее часто встреченных видов диатомей в колонке b16 (в % от общего количества)

Секция	Глубина, см	<i>Achnanthes brevipes</i>	<i>Bacterosira fragilis</i>	<i>Coscinodiscus marginatus</i>	<i>Chaetoceros</i> sp.	<i>Ch. mitra</i>	<i>Chaetoceros</i> (споры)	<i>Nitzschia</i> sp.	<i>Rhizosolenia</i> sp.	<i>Thalassiosira antarctica</i>	<i>Th. hyalina</i>	<i>Th. nordenskiöldii</i>	<i>Thalassionema nitzschioides</i>
2	0–1	3.7	2.6	1.1	12.4	5.7	59.9	4.0	0.15	0.5	0.3	4.0	0.9
	3–4	1.3	1.0	4.1	3.4	1.1	41.7	4.3	1.5	3.2	0.9	1.7	3.0
	5–6	1.8	3.5	2.2	2.4	3.9	47.5	5.1	0.6	2.7	1.1	3.1	3.1
	7–8	1.5	2.3	1.7	5.4	6.2	49.4	3.2	0.8	1.9	0.9	0.6	2.6
	9–10	3.2	1.8	0.9	12.4	5.8	35.1	4.5	0.5	3.6	0.9	0.8	2.2
	11–12	1.1	1.9	2.1	15.5	4.1	41.9	3.2	8.0	3.4	–	1.9	3.4
	13–14	0.7	3.3	1.6	14.9	3.3	44.2	3.6	0.5	3.1	–	2.5	1.1
	15–16	1.4	2.3	0.9	9.2	5.5	49.3	4.3	0.9	1.3	–	2.3	1.1
1	17–18	1.2	2.7	8.3	16.6	4.2	32.3	3.7	2.3	2.1	1.1	0.2	2.7
	19–20	0.7	2.1	1.5	19.3	6.1	42.1	5.3	2.1	0.8	0.2	1.2	2.8
	21–22	1.3	4.2	1.1	22.5	5.3	32.1	3.3	1.7	2.0	0.4	1.6	3.6
	23–24	1.0	2.1	0.7	28.4	4.0	35.6	4.5	1.6	2.0	0.9	1.8	1.4
	25–26	1.5	2.0	1.3	25.1	5.2	29.4	3.3	3.1	4.1	2.5	–	1.3
	27–28	1.3	2.1	1.0	28.0	4.0	27.3	4.1	3.4	3.0	1.3	0.3	2.7
	29–30	0.9	1.3	0.5	14.9	4.3	40.3	2.9	1.6	4.5	0.9	0.2	0.2
	31–32	0.6	1.1	0.5	14.7	2.6	45.1	4.1	2.7	2.6	0.1	1.0	1.5
	33–34	0.3	1.6	0.6	9.8	4.6	45.4	4.0	2.4	3.0	1.0	0.6	2.2
	35–36	0.8	1.6	2.3	10.5	8.4	29.0	3.9	2.6	3.9	1.5	0.3	1.6
	36–37	0.8	1.2	1.1	12.5	2.8	50.1	3.7	1.8	1.2	1.5	0.8	1.2

моря (Astakhov et al., 2019). Результаты палинологического и диатомового анализов дополняют геохимические данные для керна b16 и согласуются с реконструкцией ледовой обстановки в Арктике за последние 300–400 лет (Astakhov et al., 2019).

5. Заключение

Проведено детальное биостратиграфическое исследование колонки донных отложений, отобранной в северной части Чукотского моря, что позволило реконструировать условия осадконакопления в этой части Северного Ледовитого океана за последние 400 лет. Нижняя часть разреза образовалась во время Малого ледникового периода. Для неё характерны холодноводные диатомей и повышенное содержание спор наземных растений. В осадках верхней части колонки, накопленных после окончания МЛП, когда преобладали более теплые климатические условия, отмечается заметное сокращение холодноводных диатомей и спор наземных растений. Наличие южнобореальных, субтропических и тропических видов диатомей в отложениях северной части Чукотского моря обусловлено пере-

носом тихоокеанских вод через Берингов пролив в Северный Ледовитый океан. Транспортировка пыльцы хвойных пород и спор в район исследования осуществляется преимущественно океаническими течениями и ветром. Поступление форм юрского, мелового и неогенового возрастов в голоценовые осадки Чукотского моря происходит, вероятно, в результате абразии берегов и последующего их переноса течениями.

6. Благодарности

Авторы выражают благодарность коллегам из ТОИ ДВО РАН, ЕАВВГ и ИЗК СО РАН за помощь в отборе донных отложений, аналитическую работу и обсуждение результатов.

7. Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-27-00098, <https://rscf.ru/project/24-27-00098/>. В работе частично задействовались оборудование ЦКП «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

Астахов А.С., Вологина Е.Г., Дарьин А.В. и др. 2018. Отражение глобальных климатических изменений последних столетий в химическом составе донных осадков Чукотского моря. *Метеорология и гидрология* 4: 68–76.

Вологина Е.Г., Калугин И.А., Дарьин А.В. и др. 2018. Позднеголоценовое осадконакопление в активных геологических структурах Чукотского моря. *Геодинамика и тектонофизика* 9(1): 199–219. DOI:[10.5800/GT-2018-9-1-0345](https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-1-0345)

Диатомовые водоросли СССР. 1974. Прошкина-Лавренко А.И. Л.: Наука.

Жузе А.П., Мухина В.В., Козлова О.Г. 1969. Диатомеи и силикофлагелляты в поверхностном слое осадков Тихого океана. В кн.: *Микрофлора и микрофауна в современных осадках Тихого океана*. М.: Наука, сс. 7–47.

Огородников В.И., Русанов В.П. 1978. Условия накопления и распределение аморфного кремнезема в донных осадках Чукотского моря. *Океанология* 18(6): 1049–1052.

Саидова Х.М. 1994. Экология шельфовых сообществ фораминифер и палеосреда голоцена Берингова и Чукотского морей. М.: Наука.

Яшин Д.С. 2000. Голоценовый седиментогенез арктических морей России. Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона. Вып. 3. СПб.: ВНИИОкеангеология, сс. 57–67.

Astakhov A.S., Bosin A.A., Kolesnik A.N. et al. 2015. Sediment geochemistry and diatom distribution in the Chukchi Sea: Application for bioproductivity and paleoceanography. *Oceanography* 28(3): 190–201.

Astakhov A.S., Bosin A.A., Liu Yanguang et al. 2019. Reconstruction of ice conditions in the northern Chukchi Sea during recent centuries: geochemical proxy compared with observed data. *Quaternary International* 522: 23–37. DOI: [10.1016/j.quaint.2019.05.009](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.05.009)

Berglund B.E., Ralska-Jasiewiczowa M. 1986. *Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology*. Ed. by Berglund. Interscience, New York.

Brohan P., Kennedy J.J., Harris I. et al. 2006. Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: A new dataset from 1850. *Journal of Geophysical Research* 111: D12106.

Crane K. 2005. Russian-American long-term census of the Arctic. Initial expedition to the Bering and Chukchi Seas. *Arctic Research of the United States* 19: 73–76.

De Vernal A., Hillaire-Marcel C., Darby D.A. 2005. Variability of sea ice cover in the Chukchi Sea (western Arctic Ocean) during the Holocene. *Paleoceanography* 20: PA4018. DOI:[10.1029/2005PA001157](https://doi.org/10.1029/2005PA001157)

Grebmeier J.M., Cooper L.W., Feder H.M. et al. 2006. Ecosystem dynamics of the Pacific influenced Northern Bering and Chukchi Seas in the Amerasian Arctic. *Progress in Oceanography* 71: 331–361.

Obrezkova M.S., Pospelova V., Kolesnik A.N. 2023. Diatom and dinoflagellate cyst distribution in surface sediments of the Chukchi Sea in relation to the upper water masses. *Marine Micropaleontology* 178: 102184. DOI: [10.1016/j.marmicro.2022.102184](https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2022.102184)

Stein R., Fahl K., Schade I. et al. 2017. Holocene variability in sea ice cover, primary production, and Pacific-Water inflow and climate change in the Chukchi and East Siberian Seas (Arctic Ocean). *Journal of Quaternary Science* 32(3): 362–370.

Stone R.S. 1997. Variations in western Arctic temperatures in response to cloud radiative and synoptic-scale influences. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 102(D18): 21769–21776.

Vologina E.G., Sturm M., Astakhov A.S., Shi Xuefa. 2019. Anthropogenic traces in bottom sediments of Chukchi Sea. *Quaternary International* 524: 86–92. DOI: [10.1016/j.quaint.2019.07.008](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.07.008)

Wilson R., D'Arrigo R., Buckley B. et al. 2007. A matter of divergence: Tracking recent warming at hemispheric scales using tree ring data. *Journal of Geophysical Research* 112: D17103.